



Philips Avent, a business of Philips Consumer Lifestyle B.V.
 NL: 9206 AD Drachten, the Netherlands
 © 2018 Koninklijke Philips Electronics N.V. / Tous droits réservés.
 FR: Les marques de commerce sont la propriété du Groupe Philips.
 Derechos Reservados.
 ES: Las marcas son propiedad de Philips Group.
 © 2018 Koninklijke Philips Electronics N.V. / Todos los
 EN: Trademarks owned by the Philips Group.
 Markham, ON L6C 2S3
 Canada: Philips Electronics Ltd., 281 Hillmount Road,
 United States of America
 America LLC, P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904.
 USA: Philips Personal Health, a division of Philips North
 1.800.54.AVENT (www.philips.com/avent)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| EN User manual | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Příručka pro uživatele | PT Manual do utilizador |
| EL Εγχειρίδιο χρήσης | BR Manual do Usuário |
| ES Manual del usuario | RU Руководство |
| EE Kasutusjuhend | пользователя |
| FR Manuel d'utilisation | SL Uporabniški priročnik |
| HR Konjsnički priručnik | SR Konjsnički priručnik |
| HU Felhasználói kézikönyv | TR Kullanım kılavuzu |
| IT Manuale utente | UK Посібник користувача |
| LT Vartotojo vadovas | MT Manwal tal-utent |
| LV Lietotāja rokasgrāmata | |

ENGLISH

For your child's safety

WARNING! Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a soother; your child may be strangled by them. Do not store a soother in direct sunlight or near a source of heat, or store in disinfectant ("sterilising solution") for longer than recommended, as this may weaken the teat. Keep the removable teat protector away from children to avoid suffocation. **Before first use**, place in boiling water for 5 minutes, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the soother. This is to ensure hygiene. **Clean before each use.** Never dip teat in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the soother after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the soother becomes lodged in the mouth, **DO NOT PANIC**; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Always use this product under adult supervision. Keep it in a dry covered container. Soothers and caps are suitable for all commonly used forms of sterilisation. Wash your hands thoroughly and ensure surfaces are clean before contact with sterilised components. Night time soothers – expose handles to light before use. The soother can be cleaned by washing with warm water. DO NOT use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners on the soothers. Excessive combinations of detergents may eventually cause plastic components to crack. Should this occur, replace your soother immediately. DO NOT sterilise the display case. If you need information or support, please visit the Philips website at www.philips.com/support.

ČEŠTINA

Pro bezpečnost vašeho dítěte

VAROVÁNÍ! Před každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte. Zastavte ho dříve, než začne dýchat. Pokud zjistíte jakýchkoli známky poškození nebo opotřebení, je vyhoďte. Používejte pouze držáky na dudlíky, které byly testovány v souladu s normou EN 12586. Na dudlík nikdy nepřivazujte žádný jiný poutko, šňůrky ani kabely, dítě by se jimi mohlo udusit. Neskladujte dudlík na přímém slunci nebo poblíž zdroje tepla. Také jej neskladujte v dezinfekčním prostředku (ve „sterilizačním roztoku“) déle, než je doporučeno, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Neuchovávejte odnímatelný ochranný kryt dudlíku v dosahu dětí, aby nedošlo k udušení. **Před prvním použitím** dudlík vložte do vroucí vody na 5 minut, nechte vychladnout a z dudlíku odstraňte vodu. Před každým použitím dudlík vyčistěte. Nepoužívejte dudlík do sladkých látek nebo léků, u dítěte by mohlo dojít ke vzniku zubního kazu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů dudlík po čtyřech týdnech používání vyměňte. **NEPANIKÁRTE!** Jestliže dudlík nelze z úst vytáhnout. Není možné jej spolknout, je navržen tak, aby bylo možné zvládnout i tyto situace. Opatrně a co nejmenší jej z úst vyjměte. Výrobek používejte vždy pod dozorem dospělé osoby. Uchovávejte jej v suchu v uzavřené nádobě. Dudlíky a vložky jsou vhodné pro všechny běžné metody sterilizace. Než začnete pracovat se sterilizačními dudlíky, důkladně si umyjte ruce a zajistěte, aby byl povrch, na který je pokládáte, čistý. Dudlíky na noc – před použitím vystavte rukojím světlu. Dudlíky můžete umývat, nejlépe v horké vodě. **NEPOUŽÍVEJTE** na dudlíky abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky. Nadměrná kombinace čisticích přípravků mohou způsobit popraskání plastových částí. V takovém případě informací ihned vyměňte. **NESTERILIZUJTE** prohlédněte použito. Více informací a podpory naleznete na webových stránkách společnosti Philips www.philips.com/support.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιθεωρήστε προσεκτικά πριν από κάθε χρήση. Τεντώστε την πιπίλα προς όλες τις κατευθύνσεις. Πετάξτε την αν παρουσιάσει έστω και το παραμικρό ίχνος φθοράς ή ελαττώματος. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά κλιπ πιπίλας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12586. Μην στερεώνετε ποτέ άλλες κορδέλες ή καλώδια στις πιπίλες, καθώς το παιδί ενδέχεται να στραγγαλιστεί. Μην φυλάσσετε τις πιπίλες σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε υγρό απολύμανσης ("διάλυμα αποστείρωσης") για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις στη θήλη. Κρατάτε το αποσπώμενο προστατευτικό της θήλης μακριά από τα παιδιά, ώστε να μην πνιγούν. **Πριν από την πρώτη χρήση**, τοποθετήστε την πιπίλα σε βραστό νερό για 5 λεπτά, αφήστε τη να κρυώσει και πιέστε την ώστε να βγει τυχόν νερό που έχει παραμείνει μέσα στη θήλη. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. **Να καθαρίζετε την πιπίλα πριν από κάθε χρήση.** Μην βυθίζετε ποτέ τη θήλη σε γλυκές ουσίες ή φάρμακα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στα δόντια του παιδιού σας. Να αντικαθιστάτε την πιπίλα κάθε 4 εβδομάδες χρήσης, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Σε περίπτωση που η πιπίλα σφηνωθεί μέσα στο στόμα, **ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΙΤΕ.** Δεν είναι δυνατή η κατάποσή της και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αντιμετωφεί οποιαδήποτε κατάσταση. Αφαιρέστε προσεκτικά την πιπίλα από το στόμα, όσο πιο μαλακά γίνεται. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικα. Φυλάξτε το σε ένα στεγνό και καθαίο δοχείο. Οι πιπίλες και τα καλώδια είναι καταλληλότερα για όλες τις συνηθισμένες μεθόδους αποστείρωσης. Πριν την επαφή με αποστειρωμένα εξαρτήματα, να πλένετε καλά τα χέρια σας και να φροντίζετε οι επιφάνειες να είναι καθαρές. Η πιπίλα υκτώδης - εκθέστε τις λαβές στο φως πριν τη χρήση. Μπορείτε να καθαρίσετε την πιπίλα πλένοντας τη με ζεστό νερό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αντιβakteriικά καθαριστικά στις πιπίλες. Η υπερβολική χρήση απορρυπαντικών ενδέχεται να προκαλέσει με τον καιρό ρωγμές στα πλαστικά μέρη. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αντικαταστήστε την πιπίλα αμέσως. ΜΗΝ αποστειρώνετε τη θήλη της πιπίλας. Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support.

ESPAÑOL

Para la seguridad de su bebé

ADVERTENCIA Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones. Deseche el chupete a los primeros síntomas de deterioro o fragilidad. Utilice solo soportes diseñados para chupetes probados según la norma EN 12586. Nunca sujetar otras cintas o cuerdas al chupete, su bebé podría estrangularse con ellas. No dejar el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor ni dejarlo en contacto con un desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo que el recomendado, puesto que esto puede dañar la tetina. Mantener el protector separable de la tetina fuera del alcance de los niños para evitar asfixia. **Antes del primer uso**, mantener el chupete en agua hirviendo durante 5 min, dejarlo enfriar y extraer del chupete toda el agua retenida. Esto es por razones de higiene. **Limpiar antes de cada uso.** No introducir nunca la tetina en sustancias dulces o medicamentos, podría provocar caries al niño. Cambiar el chupete después de 4 semanas de uso por razones de seguridad e higiene. En el caso de que un chupete se quede atrapado en la boca, **NO TENGA MIEDO.** Los chupetes no se pueden tragar y están diseñados para resistir dichas circunstancias. Sacar el chupete de la boca con cuidado, tan delicadamente como sea posible. Utilizar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. Guardarlo en un recipiente cerrado y seco. Los chupetes y las tapas son aptos para todas las formas de esterilización. Lávese bien las manos y asegúrese de que las superficies estén limpias antes de que entren en contacto con los componentes esterilizados. En el caso de los chupetes nocturnos, exponga las anillas a la luz antes de usarlos. Se puede limpiar el chupete lavándolo con agua caliente. NO utilizar agentes de limpieza abrasivos ni limpiadores antibacterias con los chupetes. La excesiva combinación de los detergentes puede provocar que los componentes de plástico se agrieten. Si ocurriera esto, sustituya el chupete de inmediato. NO esterilizar la caja exterior. Si necesita información o asistencia, visite el sitio Web de Philips en www.philips.com/support.

EESTI

Teie lapse ohutuseks

HOIATUS! Kontrollige luti enne iga kasutuskorda hoolikalt. Tõrjake seda iga suuna. Esimeste kahjustuste või kulumise märkide ilmumisel visake lutt minema. Kasutage üksnes spetsiaalselt loodud hoidjaid, mida on kontrollitud sõltuvalt EN 12586 kohaselt. Ärge kunagi siduge luti külge pealu ega nööre, need võivad haavata teie lapse lämbumisõhku. Ärge hoidke luti otsese päikese käes või kuuma kohas ega hoidke seda desinfitsoonivahendites (steriliseerimisilahustes) kauem kui soovitatud, sest see võib luti kahjustada. Lämmustõrju vältimiseks hoidke eemaldatav luti kahesta laste käelastest eemal. Pange lutt enne **esmakasutust** viieks minutiks keevasse vette, laske jahtuda ning raputage välja luti jäänud vesi. See on vajalik hügieeni tagamiseks. **Puhastage luti enne iga kasutuskorda.** Ärge kastke luti magustades ainetesse või ravimitesse, sest see võib lagundada teie lapse hambaid. Vahetage lutt ohutuse ja hügieeni kaalutlustel välja iga nelja nädala järel, juhul kui lutt jääb suhu kinni. **ÄRGE SATTUGE PAANIKASSE!** luti ei saa alla neelata ja see on disainitud selliste juhtumitega toimetulemiseks. Eemaldage see ettevaatlikult suust, nii õrnalt kui võimalik. Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seda kuivas, kaanega kaetud nõus. Luttidele ja nende kordidele tekitab kõik üldkasutatavad steriliseerimisviisid. Peske hoolikalt käsi ja veenduge, et pinnad on enne steriliseeritud osade kokkupuutumist puhtad. Õõlutiid – hoidke luti käepide meega pestes. ÄRGE kasutage luttide puhastamiseks abuvahendeid ega antibakteriaalseid puhastusvahendeid. Liigsed puhastusvahendid võivad põhjustada lutt koha välja. Mõjane teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support.

ENGLISH (US and CANADA)

Nipple specially designed to ensure natural development of teeth and gums. Pacifiers and covers are suitable for sterilizing by means of a Philips AVENT Steam Sterilizer or boiling in water for at least 5 minutes. After sterilization, place nipple to cool for at least 5 minutes and remove any trapped water before use. Do not sterilize the display case. IMPORTANT: Philips AVENT pacifiers are available in sizes ranging from 0 to 18 months. For your child's safety, always follow age guidelines accordingly. Do not allow baby to play with the clear caps. **For your child's safety WARNING! Do Not Tie Pacifier Around Child's Neck as it Presents a Strangulation Danger.** In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing the pacifier after 4 weeks for safety and hygiene reasons. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Never dip nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. In the event the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Keep the removable protection (cap) for the nipple away from children to avoid suffocation. Always use this product under adult supervision. Inspect carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.

előtt tartsa a fénybe. A cumit meleg vízzel is meg lehet tisztítani. Ne használjon dörzsözőcsapot vagy antibakteriális tisztítószereket a cumi tisztításához. A tisztítószerek túlzott használata repedést okozhat a műanyagban. Amennyiben ez előfordul, azonnal cserélje le a cumit. A csomagolást NE sterilizálja. Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a Philips weboldalára a www.philips.com/support címen.

ITALIANO

Per la sicurezza del vostro bambino

ATTENZIONE! Controllate sempre il prodotto prima dell'uso. Tirate il succhietto in tutte le direzioni. Sostituitelo ai primi segni di deterioramento. Utilizzate solo porta succhietti specifici testati in base alla normativa EN 12586. Per evitare il pericolo di strangolamento, non legare mai nastri o cordoncini di altro tipo al succhietto. Non lasciate il succhietto sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore o immerso nel liquido disinfettante ("soluzione di sterilizzazione") più a lungo di quanto consigliato, poiché la tettarella potrebbe deteriorarsi. Tenete il proteggi tettarella rimovibile lontano dalla portata dei bambini per evitare il pericolo di soffocamento. **Al primo utilizzo**, ponete il succhietto in acqua bollente per 5 minuti, lasciate raffreddare ed eliminate l'acqua in eccesso. **Già garantisce l'igiene. Eseguite la pulizia prima dell'uso.** Non immergete mai la tettarella in sostanze dolci o in medicinali, poiché potrebbero provocare carie. Per motivi igienici e di sicurezza, sostituite il succhietto dopo 4 settimane di utilizzo. Nel caso in cui il succhietto rimanga incastrato nella bocca del bambino, **NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO**; la tettarella non può essere inghiottita ed è progettata in modo che questo non avvenga. Estratela dalla bocca del bimbo con la massima attenzione e delicatezza. Usate sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. Tenetelo in un recipiente asciutto e chiuso. I succhietti e i tappi sono adatti ad essere sterilizzati secondo le procedure più comuni. Lavatevi accuratamente le mani e assicuratevi che le superfici con cui vengono a contatto le parti sterilizzate siano pulite. Succhietti per la notte: prima dell'uso esponete le impugnature alla luce. Il succhietto può essere pulito lavandolo con acqua calda. **NON** pulite il succhietto con detergenti abrasivi o antibatterici. L'utilizzo eccessivo di detergenti di vario tipo può causare la rottura delle parti in plastica. Se si verifica tale eventualità, sostituite immediatamente il succhietto. **NON** sterilizzate la confezione. Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support.

LIETUVIŠKAI

Jūsų vaiko saugumui

ĮSPĖJIMAS! Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite. Patampykite čiulputką į visas puses. Pasirodžius pirmiesiems pažaidimo ar susilpnėjimo požymiams gaminį išmeskite. Naudokite tik specialius pagal EN 12586 patikrintus čiulputkų laikiklius. Prie čiulputuko nekadą neršikite jokiu juosteliu ar virveliu, nes vaikas gali pasismaugti. Nelaikykite čiulputuko tiesioginėje saulės šviesoje ar šalia šilumos šaltinio, nelaikykite jo dezinfekavimo skystyje („sterilizavimo tirpale“) ilgiau nei rekomenduojama, nes dėl to gali suprustėti čiulputuko kokybė. Nuimamą čiulputko apsaugą saugokite nuo vaikų, kad juo neudžustų. **Prieš naudodami pirmą kartą**, įdėkite 5 minutes į verdantį vandenį, leiskite atvėsti ir išspauskite viduje esantį vandenį. Taip pasirūpinsite higiena. **Kaskart naudodami nuplaukite.** Niekada nemerkiu čiulputuko į šaldžias medžiagas ar vaistus, tai gali sukelti kanes. Saugumo ir higienos sumetimais čiulputką pakeiskite po 4 savaitių naudojimo. Jei čiulputkas įstrigęs burnoje, **NEPULKITE Į PANIKĄ** – jo neįmanoma praryti ir jis sukurta taip, kad būtų galima sustabdyti tokiu atveju. Atsargiai ir švelniai išimkite jį iš burnos. Šį gaminį visada naudokite sušildžiusiems prižiūrint. Laikykite čiulputką sausame uždengiamame inde. Čiulputkai ir dangteliai tinkami sterilizuoti visais įprastais naudojamos būdais. Prieš imdami už sterilizuotų dalių kraštus išnuplaukite rankas ir įsitikinkite, kad su jomis besiliečiantys paviršiai yra švarūs. Naktiniai čiulputkai – prieš naudodami palaukite, kol rankenėlės šviesos. Čiulputką galima plauti šiltame vandenyje. Čiulputkams valyti **NENAUDOKITE** šiurkščių valymo priemonių arba antibakterinių valiklių. Nuo per didelės valymo priemonių koncentracijos plastikinės dalys ilgai gali imti trūkinėti. Taip atsitiks, iš karto pakeiskite čiulputką. **NESTERILIZUOKITE** dangtelio. Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support.

LATVIEŠU

BRĪDINĀJUMS jūsu mazulā drošībai!

BRĪDINĀJUMS! Rūpīgi pārbaudiet pirms katras lietošanas reizes. Paveiciet knupīti visos virzienos. Izmētiet pie pirmajām bojājuma pazīmēm. Izmantojiet tikai paredzētus knupītņu turētājus, kas testēti atbilstoši EN 12586. Nekad knupītiem nepievienojiet lentes vai aukliņas, jo jūsu mazulis var ar tām nozāpāties. Neglabājiet knupīti tieši saulės staru iedarbībā vai pie siltuma avota un neglabājiet to dezinfekcijas šķīdumā (sterilizējošā šķīdumā) ilgāk par ieteicamo laiku, jo tas var sabojāt knupīti. Glabājiet nenomamo knupja aizsargu bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu nosmakšanas risku. **Pirms lietošanas reizes** ievietojiet to vārsošā ūdenī uz 5 minūtēm, ļaujiet atdzist, un izspiediet jebkādu pāri palikušo ūdeni ārā no knupīša. Tādējādi tiks nodrošināta higiēna. **Notīriet katras lietošanas reizes.** Nekad neiegremdējiet knupīti šaldās vielās vai medikamentos, jo jūsu mazulis var sabojāt zobus. Normāniet knupīti pēc 4 nedēļu ilgās lietošanas drošības un higiēnas apsvērumu dēļ. Gadījumā, ja knupītis iestrēgst mazulā mutē, **NEKRĪTIET PANIKĀ** - to nevar norīt un tas ir izstrādāts tā, lai šādi gadījumi nenotiktu. Uzmanīgi izņemiet to no mutes, iespējami saudzīgi. Vienmēr izmantojiet šo produktu uzturamā uzturā. Glabājiet to sausi, noslēgtā traukā. Knupīti un vāciņi ir piemēroti visām plaši lietotajām sterilizācijas metodēm. Rūpīgi nomazgājiet rokas un pārliecinieties, lai pirms saskares ar sterilizētiem komponentiem virsmas būtu tīras. Nakts knupīti - pirms lietošanas patiniet rokstus gaismā. Knupīti var notīrīt, nomazgājot to ar siltu ūdeni. **NELIETOJĒT** abrazīvu trīšanas līdzekļus vai antibakteriālus trīšanas līdzekļus. Pārmaiņīga mazgāšanas līdzekļu apvienošana var izraisīt plastmasas detaļu pilsūmus, ja tā notiek, nekavējoties nomainiet knupīti. **NESTERILIZĒJĒT**, ja knupītim ir displejs, ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzat, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support.

POLSKI

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka

OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Podciągaj smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzuć go, gdy zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia lub zużycia. Używaj wyłącznie dedykowanych uchwyotów do smoczka zgodnych z normą EN 12586. Nigdy nie przyczepiaj wstążek ani pasków do smoczka, ponieważ może to spowodować uduszenie się dziecka. Nie przechowywaj smoczka w miejscu nasłonecznionym, w pobliżu źródła ciepła, ani w płynie dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas, niż jest to zalecane, ponieważ może to obniżyć trwałość smoczka. Przechowywaj nasadkę zabezpieczającą smoczka z dala od dzieci, aby nie dopuścić do zadławienia. **Przed pierwszym użyciem** włóż smoczek do wrzącej wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii w jamie ustnej, **NIE PANIKUJ**, nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić rozwiązanie takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka. Dziecko może używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywuj smoczek w suchym pojemniku pod przykryciem. Smoczki i nasadki można sterylizować w typowy sposób. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnię, na której będą one umieszczane. Smoczki na noc — przed użyciem wstaw do wody na 5 minut. **NIE PANIKUJ**, jeśli przed użyciem włożyłeś smoczek do wody na 5 minut, poczekaj, aż ostygnie, i wyciśnij z niego resztkę wody. Mał na całe zachowanie higieny. **Wyczyść przed każdym użyciem.** Nigdy nie zanurzaj smoczka w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy zębów dziecka. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny wymień smoczek po 4 tygodniach używania. W przypadku, gdy smoczek utkwii